Nom	Type	Écologie/habitat	Rareté
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, Savić et Tibell *morpho. calcarea*=(*Aspicilia calcarea* (L.) Körb.)	Crustacé non ou indistinctement lobé	Saxicole, sur roches et blocs ± calcaires exposés, parfois sur pierres au niveau du sol.	Assez commun Non menacé
Aspicilia contorta subsp. contorta (Hoffm.) Kremp.	Crustacé gris brunâtre à gris verdâtre, constitué de verrues ± arrondies.	Saxicole, calcicole, surtout sur pierres et petits blocs sur le sol, également sur mur, mortier, rochers non loin du sol.	Assez peu commun. Non menacé
Biatoropsis usnearum Räsänen s.l	Lichen lichénicole globuleux blanc-crême	Parasite les Usnées	Rare. Non menacé
Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig.	crustacé, épiphléode, granuleux, parfois pulvérulent	surtout dans les fissures des écorce de conifères, ± à l'abri des pluies	Assez commun Non menacé
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.	Squamuleux à podétions	Lichen des sols sur terre et mousses des talus, bois en décomposition, base des troncs.	Très commun Non menacé
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.	Squamuleux à podétions	lichen lignicole, quelquefois corticole, terricole, muscicole, calcifuge.	Commun Non menacé
Cladonia fimbriata (L.) Fr.	Squamuleux à podétions	Terricole, sur sol argilo-sableux, sableux ou humifère, lignicole, sur bois décomposé ou corticole, à la base des troncs.	Commun Non menacé
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot	Squamuleux à podétions	lichen des sols saxiterricole, saxicole, calcicole, muscicole au soleil.	Commun Non menacé
Cladonia rangiformis Hoffm.	Squamuleux à podétions	Lichen des sols, pelouses ensoleillées, calcaires ou non	Assez commun. Non menacé
Cladonia squamosa (Scop.) Hoff. (1796)	Squamuleux à podétions	terricole, humicole, muscicole, lignicole, corticole, saxicole, saxifuge.	Assez commun. Non menacé
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.	Squamuleux à podétions	Lichen des sols sur sol acide sableux ou riche en humus	Assez commun. Non menacé
Clauzadea metzleri (Körb.) Clauzade et Cl. Roux ex D. Hawksw.	crustacé, endolithique, gris blanchâtre, mais souvent plus sombre	principalement sur petites pierres calcaires près du sol.	Assez commun. Non menacé
Coniocarpon cinnabarinum DC.	Crustacé endo-substratique, brun pâle ± teinté de rougeâtre, lisse avec des taches rougeâtres dispersées	Corticole, sur feuillus.	Commun Non menacé
Dendrographa decolorans (Turner & Borrer ex Sm.) Ertz & Tehler *morpho. decolorans*	Crustacé, épiphléode	Sur écorce de feuillus et de conifères	Commun Non menacé

Evernia prunastri (L.) Ach *chémo prunastri*	Fruticuleux à lanières pendantes	Corticole, aussi bien sur feuillus que sur conifères, dans des endroits plutôt ensoleillés.	Très commun Non menacé
Flavoparmelia caperata (L.) Hale	Foliacé vert jaunâtre à jaune verdâtre	Corticole, sur feuillus, rarement sur conifères, parfois sur roches ou sur sols non calcaires.	Très commun Non menacé
Graphis pulverulenta (Pers.) Ach.	Crustacé, non lobé	Corticole sur les arbres à écorce lisse et à feuillage caduc, dans des stations humides.	Très commun Non menacé
Graphis scripta (L.) Ach	Crustacé, lisse ou un peu ondulé	Corticole sur les arbres à écorce lisse et à feuillage caduc, dans des stations humides.	Commun Non menacé
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. var. *jenensis*			Assez commun. Non menacé
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.	Foliacé à lobes allongés	Surtout corticole, sur troncs, branches et branchettes de conifères et feuillus isolés ou en forêts claires ; plus rarement saxicole calcifuge ou muscicole.	Très commun Non menacé
Lathagrium cristatum var. cristatum (L.) F.H. Wigg.	Foliacé à Nostoc	Surtout sur rochers calcaires ensoleillés, parfois sur le sol.	Commun Non menacé
Lecanora chlarotera subsp. chlarotera Nyl. f. rugosella (Zahlbr.) Poelt	Crustacé, non lobé, plus ou moins bien délimité, grossièrement granuleux	Corticole dans des forêts claires ou sur des arbres isolés à feuillage caduc et plutôt à écorce lisse dans des stations modérément humides.	Très commun Non menacé
Lepra amara (Ach.) Hafellner.	Crustacé bien délimité	Sur les feuillus (érables, frênes, tilleuls…), rare sur conifères ou au sol sur la végétation basse.	Commun Non menacé
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Foliacé de grande dimension	Sur troncs et branches principales de feuillus dans les vieilles forêts, parfois sur roches moussues non calcaires.	Assez commun Potentiellement menacé
Lobarina scrobiculata (Scop.) Cromb.	Foliacé attaché au niveau de sa partie centrale	Vieux troncs et branches principales de feuillus, plutôt en bordure de forêts, parfois au sol parmi les mousses	Assez rare Potentiellement menacé
Nephroma laevigatum Ach.	Foliacé	Corticole, ou sur mousses des troncs d'arbres à feuillage caduque, plus rarement sur rochers moussus.	Assez commun. Non menacé
Nephroma parile (Ach.) Ach.	Foliacé	Sur feuillus, sur écorces et mousses corticoles, dans les vieilles forêts.	Assez commun. Non menacé

Pannaria conoplea (Ach.) Bory	Foliacé	Corticole, surtout sur troncs de feuillus, parfois muscicole sur roches moussues non calcaires.	Peu commun Potentiellement menacé
Parmelia sulcata Taylor	Foliacé formant des rosettes	Corticole, sur troncs et branches de feuillus, plus rarement de conifères.	Très commun Non menacé
Parmotrema perlatum (Huds) M. Choisy	Foliacé gris-bleuté	Corticole, sur feuillus, plus rarement sur conifères, parfois aussi lignicole ou saxicole-calcifuge ou muscicole.	Commun Non menacé
Parabagliettoa pinguicula (A. Massal.) Orange	crustacé, endo- ou épisubstratique, aréolé, fendillé	saxicole, sur rochers ou blocs (sommets, surfaces horizontales, inclinées ou verticales) calcaires.	Assez peu commun Non menacé
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.	Foliacé à Nostoc	Sur tout type de substrats non ou peu calcaires, sol humifère, mousses, rochers moussus, base de troncs d'arbre moussus, etc.	Commun Non menacé
Peltigera hymenina (Ach.) Delise	Foliacé à Nostoc	Parmi les mousses et les herbes.	Peu commun Potentiellement menacé
Peltigera malacea (Ach.)Funck	Foliacé à Nostoc	Terricole (sur sol humifère ou non), saxicole calcifuge, souvent parmi les mousses.	Peu commun Potentiellement menacé
Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.	Foliacé à Nostoc	Terricole, muscicole (sur mousses saxicoles, rarement lignicoles) ou saxicole (sur rochers moussus).	Assez commun. Non menacé
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.	Foliacé à Nostoc	Sur de nombreux substrats non ou peu calcaires.	Assez peu commun Non menacé
Pertusaria flavida (DC.) Laundon	Crustacé mince, non lobé , jaune verdâtre	Corticole, sur écorces rugueuses de feuillus, dans les zones de forêts plutôt bien éclairées	Peu commun Potentiellement menacé
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.	Crustacé épais	Sur écorces lisses ou rugueuses ; peut aussi se rencontrer sur roche siliceuse, monuments, murs.	Assez commun Non menacé
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.	Crustacé mince non lobé	Corticole, surtout sur troncs et grosses branches d'arbres à feuillage caduc mais aussi de résineux	Commun Non menacé
Physcia clementei (Turner) Lynge	foliacé, gris clair, fortement apprimé au substrat,	sur tronc et branches de feuillus	Assez peu commun Non menacé

Placynthium nigrum (Huds.) Gray	Crustacé, non lobé au pourtour avec un hypothalle bleu.	Saxicole, plus ou moins calcicole. S'établissant sur des roches ou des substrats diversement calcaires.	Commun Non menacé
Ramalina farinacea (Hoffm.) Fürnrohr *chémomorpho. farinacea*	Fruticuleux, arborescent, ± pendant,	Corticole, sur de nombreuses écorces de troncs et branches.	Très commun Non menacé
Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin.	Foliacé, gélatineux	Terricole, corticole, muscicole, saxicole	Commun Non menacé
S*cytinium pulvinatum* (Hoffm.) Ótarola, P.M. Jørg. et Wedin	Foliacé, gélatineux	Saxicole calcicole sur ou mélangé à des bryophytes sur des rochers calcaires, mais aussi sur des substrats différents.	Commun Non menacé
Unguiculariopsis lettaui (Grummann) Coppins	Lichen lichénicole noir Parasite d'Evernia prunastri	Parasite d' Evernia prunastri.	Peu commun. Patrimonial d'intérêt national. Potentiellement menacé
Usnea ceratina Ach.	Fruticuleux buissonnant, petit ou long.	Corticole, sur feuillus et conifères dans les zones humides	Assez commun Non menacé
Usnea esperantiana P. Clerc	Fruticuleux buissonnant, petit	Corticole, sur tronc et branches de feuillus, plus rarement de conifères.	Assez commun Non menacé
Usnea rubicunda Stirt.	Fruticuleux maculé de rougeâtre	Corticole (sur feuillus, plus rarement conifères), rarement saxicole-calcifuge (sur rochers ombragés), surtout en milieu forestier.	Assez commun Non menacé
Verrucaria hydrela Ach.	Crustacé subaquatique verdissant au contact de l'eau	Saxicole, sur rochers calcaires ou non calcaires, inondés temporairement.	Assez commun Non menacé
Verrucaria nigrescens var. nigrescens	Crustacé superficiel, brun-noir à noirâtre, mat, ne verdissant pas au contact de l'eau	Sur roche plutôt calcaire, pierres, substrats artificiels :murs, tuiles, mortier. ciment, béton... Rarement corticole ou lignicole.	Très commun Non menacé
Xanthocarpia lactea (A. Massal.) A. Massal. éco. lactea	crustacé non visible ou indistinct, quelquefois légèrement blanchâtre.	sur les cailloux ou petites pierres calcaires sur le sol ; ses petites apothécies jaune orangé le différencie de Caloplaca marmorata	Assez commun Non menacé
51 taxons			